

Spinselmotten waren ook in 2011 weer actief

Ook dit jaar waren de rupsen van de spinsel- of stippelmotten (soorten van het geslacht *Yponomeuta*) weer erg actief. In Nederland komen zeven soorten voor, ieder met hun eigen gastheer. Op de Kardinaalsmuts alleen leven drie verschillende soorten, op de Meidoorn, Appel, Pruim, Sleedoorn, Populier en Wilg één soort. De rupsen zijn in de spinsels goed beschermd tegen eventuele vijanden, maar eigenlijk is dat niet eens nodig. Voor vogels zijn ze giftig. Er zijn wel sluipwespen die hun eieren op de rupsen leggen maar die kunnen door de spinsels

de rupsen moeilijk bereiken. Op een gegeven moment zijn de larven volgroeid en gaan ze verpoppen, dat zal in de tweede helft van juni zijn. Dan zie je ze in grote hoeveelheden langzaam aan spinseldraden uit de bomen zakken. De rupsen kruipen de grond in en verpoppen daar. In augustus komen de vlindertjes of motjes te voorschijn. Het zijn kleine, tere dieren met witte vleugels met zwarte stippen, vandaar hun naam: stippelmotten. De rupsen vreten de bomen volledig kaal. Dat is natuurlijk geen fraai gezicht (zie foto links). Vandaar dat een

sterke aantasting de aandacht trekt van zowel terreinbeheerders als publiek. Het kan echter geen kwaad. De verpopping vindt plaats voordat de bomen en de struiken voor de tweede maal uitlopen. Dat gebeurt rond 21 juni, het feest van Sint Jan, het tweede lot van een boom of struik heet dan ook het Sint Janslot. En half juli is er niets meer dat herinnert aan de kaalgevreten bomen en struiken (zie foto rechts).

Waalsdorpervlakte nabij Den Haag
Foto's: Joost Gieskes

